

Synthèse

Le SIDA : une pandémie, plusieurs épidémies

Bref rappel : le SIDA, c'est quoi ?

- SIDA = Syndrome d'Immuno-Déficiência Acquisée.
- Infection causée par le VIH (Virus d'Immuno-déficiência Humaine) qui affaiblit les défenses immunitaires de la personne contaminée.
- **Maladie récente**, découverte dans les années 80.
- **Ampleur** de la pandémie : tous les continents sont touchés, cause de **30 millions de morts et 60 millions de personnes atteintes** par le VIH depuis la découverte de la maladie.
- Il est impossible de se débarrasser du virus.
- Ses **symptômes** restent **longtemps invisibles**, ce qui augmente les risques de contamination.
- Touche particulièrement les **jeunes adultes** en âge de procréer et de travailler => impacts économiques et démographiques.

-Le VIH se transmet par :

1. Le **sang** : contaminations dues aux **drogues injectables**, aux **transfusions sanguines** et (aux transferts pendant la **grossesse** de la mère à l'enfant).
2. Les **sécrétions sexuelles** : contaminations dues aux **rapports** sexuels au sein du couple (rapport **homosexuels** et **hétérosexuels**) et au **commerce du sexe**.
3. Le **lait maternel**.

La géographie actuelle

Après avoir observé plusieurs représentations de la géographie de l'épidémie à l'échelle mondiale (carte de la prévalence, carte de la prévalence par anamorphose basée sur la population, graphique de la prévalence rapportée au PIB/hab et la dynamique de ce dernier) nous avons compris que la pauvreté, souvent rendue responsable, n'était pas un facteur suffisant pour comprendre la propagation de l'infection et nous avons dégagé trois régions du monde dont les dynamiques internes pourraient nous aider à comprendre la géographie du SIDA.

L'Afrique Subsaharienne : la plus durement touchée

- On y retrouve le plus grand nombre de personnes atteintes par la maladie et les plus hauts taux de prévalence.
- Transmission principalement par contacts hétérosexuels.
- Hétérogénéité spatiale et temporelle au sein de la région : prévalences et évolutions très différentes d'une zone à l'autre. Les années 90 marquent un glissement du foyer épidémique de l'Afrique centrale et orientale vers l'Afrique australe.
- Mécanisme de l'évolution de la géographie du SIDA :
 - Principalement basées sur les migrations.

- Ensuite, fonction du contexte global comme les guerres civiles (déplacement de population) ou les politiques ségrégationnistes,...

La Chine, l'Asie du Sud et du Sud-Est : la plus grande menace

- Chine : représentative de l'Asie du Sud, du Sud-Est et du Pacifique.
- Passage de l'épidémie par différentes phases => des géographies différentes se superposent :
 - Jusqu'aux années 90 : rares cas liés aux voyages des Chinois à l'étranger.
 - Début des années 90 : concentration de l'épidémie au sein des consommateurs de drogues injectables.
 - Milieu des années 90 : passage à une épidémie caractérisée par la transmission hétérosexuelle.
 - Rôle important du marché du sexe : la mobilité des prostituées et des clients donne sa dynamique à l'épidémie.
 - Dernièrement : les migrants en général constituent un groupe à risque : pratiques différentes, comportements à risque (baisse de pression sociale, éloignement du conjoint,...), population marginale, ne parle souvent pas la langue => pas visés par les politiques de prévention.
 - Les migrations sont temporaires => transmission de l'infection au retour dans leur région d'origine.
 - Ils sont à la base d'une diffusion à large échelle.

L'Europe orientale et Asie centrale : l'explosion épidémique

- Jusqu'en 1995, pas de problème apparent avec le VIH.
- En 1997, la situation bascule. Causes de l'augmentation de l'infection au VIH et des cas de SIDA : chute, en 1991, des régimes soviétiques => perte de la sécurité humaine (plein-emploi, soins de santé et éducation pour tous,...) => pauvreté, désespoir, drogues, maladie,... : contexte propice à l'expansion de la maladie.
 - Initialement : épidémie axée sur la consommation de drogues injectables.
 - Ensuite : passage à une épidémie caractérisée par la transmission hétérosexuelle, car :
 - Professionnels du sexe souvent consommateurs de drogues.
 - Partenaires sexuels de consommateurs de drogues => augmentation du nombre de femmes infectées.
- Entre 2000 et 2009, multiplication par 3 du nombre de personnes vivant avec le SIDA, passant de 530 000 à 1,5 million.
- Aujourd'hui, seule zone du monde où la prévalence continue d'augmenter.
- Ukraine et Fédération de Russie : près de 90% des nouvelles infections de 2006.

Conclusion

Il n'y a de facteur unique pour comprendre la géographie de la maladie, celle-ci est fonction du contexte (politique, social, culturel, économique) de chaque espace et ce, quelle que soit l'échelle d'observation : mondiale, régionale, nationale et intra-nationale. Les différents contextes fragmentent la pandémie en de nombreuses épidémies qui se distinguent par leur intensité, leur évolution et par leur impact. → « Une pandémie mais plusieurs épidémies ».